



Jueves Forestal

Edición 5

noviembre 2025

En esta edición, les traemos una variedad de palmas que están en nuestro Valle del Cauca, pero también en otras regiones de América Latina.

Algunas se caracterizan por poseer muchos tallos, otras por ser “barrigonas” y otras por tener semillas comestibles, como el popular corozo. En especial, esta nos ha acompañado desde hace milenios. Por otra parte, la chontilla solo está en Colombia y tiene varios tallos, mientras que la chichagüi tiene solo uno, pero lleno de espinas.

Lo interesante de las palmas no son solo sus frutos, sino su cogollo, pues algunos son comestibles, como el del palmiche y la misma chichagüi. En cuanto a especies mucho más conocidas, la palma zancona puede ser vista en la Plaza de Caicedo, en Cali, la palma de coco puede ser observada y disfrutado su fruto en cualquier playa o costa, y la emblemática palma de cera puede ser avistada en Tenerife, municipio de El Cerrito y en La Nevera, Palmira.

No obstante, algunas de ellas están en peligro por su aprovechamiento indiscriminado o la pérdida de sus hábitats. Por otra parte, algunas pueden ser usadas en procesos de restauración ecológica. En el Jueves Forestal promovemos la conservación de nuestro patrimonio natural y las palmas juegan un papel especial.

Comite editorial

Karol Vivian Arango Muriel, Andrés Mauricio Guzman Ferraro, Narcizo Laureano Rodríguez
Diego Fernando Velez Navia, Mauricio Lamos Lesmes

Editorial

Palma de cera (*Ceroxylon quindiuenses*)

Familia: *Areacaceae*



Esta palma nativa es el árbol nacional, declarada mediante la Ley 61 de 1985, la cual también definió que está prohibida su tala "bajo sanción penal".

Es considerada la palma más alta del mundo. Puede alcanzar 60 metros de altura y entre 25 a 40 centímetros de diámetro. Se estima que pueden vivir más de 200 años.

Crece entre los 2000 y 3100 metros sobre el nivel del mar. Es de crecimiento lento. En el Valle del Cauca, es posible encontrar miles de palmas de cera en el corregimiento de Tenerife (El Cerrito). También se puede observar en la vereda de La Nevera (Palmira).

Sus frutos son apetecidos por urracas, tucanes, mirlas y loros. El 16 de septiembre es el Día Nacional de la Palma de Cera.

La palma de cera está en el grado de amenaza en peligro (EN), es decir, enfrenta un peligro muy alto de extinción en estado de vida silvestre (Resolución 1912 de 2017).

Palmiche

(Sabal mauritiiformis)

Es una especie de palma nativa, muy abundante en la región Caribe, pero también presente en el Valle del Cauca. Puede alcanzar hasta los 20 metros de altura y 40 centímetros de diámetro.

En el Valle del Cauca, es común encontrarla en cercas vivas y también en potreros. Crece de manera óptima en tierras bajas, desde el nivel del mar hasta los 1000 metros de altitud, en el bosque seco tropical.

Tolera inundaciones periódicas, se reproduce por semillas y es de crecimiento lento. En Colombia, se encuentra en la categoría de casi amenazada (NT).

Esta especie es utilizada por las comunidades para la construcción de techos de quioscos con sus hojas. El palmito o cogollo es comestible.

*El fruto es consumido por el tití, el mono aullador (*Alouatta seniculus*), la ardilla (*Sciurus granatensis*) y el ñeque (*Dasyprocta fuliginosa*).*



Palma de corozo (*Aiphanes horrida*)

Familia: Arecaceae Estado de conservación: preocupación menor (LC).

Estado de conservación: preocupación menor (LC).

Especie de palma nativa que alcanza los 15 metros de altura y los 10 centímetros de diámetro. Su tallo está densamente cubierto de espinas negras. Sus frutos son consumidos por las aves, entre ellas, azulejos y tángaras rastrojeras.

Sus semillas son comestibles. En Colombia, se han encontrado semillas carbonizadas, del año 2800 a.C. que, se presume, pertenecen a esta especie, lo que podría demostrar su uso desde épocas remotas. También es plantada como especie ornamental, por el color de su fruto y las formas de sus hojas.

Es de crecimiento rápido y se desarrolla bien en suelos con buen drenaje, entre los 100 y 1700 metros sobre el nivel del mar, especialmente en bosques secos. En la etapa inicial de crecimiento, requiere sombra parcial.



Palma de coco

(Cocos nucifera)



Esta especie es considerada nativa de América Tropical, pero la hipótesis más fuerte es que se originó en islas del Pacífico asiático. Aunque su origen es incierto, hay evidencias de que ya se encontraba en lo que ahora es Panamá, a la llegada de los españoles.

Estas palmas pueden alcanzar hasta los 20 metros de altura y 40 centímetros de diámetro. Crecen desde el nivel del mar hasta 1500 metros de altitud.

No tolera el frío; se desarrolla en diferentes tipos de suelos, siempre y cuando tengan buen drenaje. Requiere sitios soleados para su desarrollo y no tolera la sombra.



Existen muchas variedades de esta especie, más de 100 en todo el mundo: las hay de frutos verdes, amarillos, enanos y gigantes.

Es plantada con fines ornamentales y su fruto es consumido fresco, del cual se pueden obtener diferentes tipos de aceites para uso gastronómico o en la industria cosmética. La cáscara de sus frutos también puede ser utilizada como combustible.



Debido a su sistema de raíces fibrosas, no representa mayor riesgo para infraestructura aledaña, pero hay que tener cuidado con la caída de sus hojas y frutos. En este sentido, no hay que plantarla cerca de sitios donde haya tránsito frecuente de personas.

Palma barrigona (*Iriartea deltoidea*)

Especie de palma nativa desde Nicaragua hasta Bolivia. En el Valle del Cauca, crece desde el nivel del mar hasta los 850 metros de altitud en la cordillera Occidental.

Es una palma de tallo solitario que alcanza hasta los 25 metros de altura y 30 centímetros de diámetro. Regularmente, presenta engrosamiento en el tallo, de ahí el apelativo de barrigona.

Es de crecimiento lento, se estima que tarda más de 50 años para alcanzar la edad adulta y puede vivir más de 100 años. Presenta un cono denso de raíces zancos en la base; esta especie habita en bosques húmedos tropicales. La polinización es llevada a cabo por abejas.

Fructifica a lo largo de todo el año y los murciélagos dispersan sus semillas. Las comunidades utilizan el material de su tallo para realizar construcciones; sus hojas para techar; los frutos para alimentar animales y las semillas para elaborar artesanías.



Chichagui

(Bactris gasipaes var. Chichagui)



Esta es una especie de palma nativa, siendo la variedad silvestre del chontaduro. Se reconoce porque su tallo está cubierto de espinas, de aproximadamente 7 centímetros de largo, agrupadas en anillos.

Es una planta cespitosa, es decir, que presenta varios tallos de hasta 18 metros de altura. Crece rápidamente, desde los 100 hasta los 1300 metros de altitud, en suelos bien drenados y puede vivir entre 50 y 75 años.

Se puede encontrar dentro de guaduales, bosques, potreros y cercas vivas. Sus frutos son más pequeños que los del chontaduro. Los cogollos son comestibles y los tallos son usados para construir casas y corrales en algunas regiones. Los principales polinizadores son insectos.

El chichagüí es una especie muy amenazada por la destrucción de su hábitat. Es importante conservar esta variedad silvestre para programas genéticos o mejoramientos que se pretendan realizar con la variedad cultivada. Por esta razón, requiere la implementación de programas de conservación de manera urgente.

Palma molinillo

(Chamaedorea pinnatifrons)

Especie de palma nativa desde México hasta Bolivia. Es una especie abundante y ampliamente distribuida. Habita en los bosques andinos, entre los 1000 y 2500 metros de altitud; es una palma de tallo solitario que alcanza hasta los 4 metros de altura y 2.5 centímetros de diámetro. Es poco longeva; sus frutos son de color naranja cuando están inmaduros, tornándose en morado oscuro al madurar. Se desarrolla mejor en el sotobosque y en lugares húmedos. Se considera una especie gregaria o que se agrupa con otras.



Presenta raíces adventicias en la base, por lo que en algunas comunidades utilizan la parte inferior del tallo y parte de las raíces para construir un molinillo para batir bebidas.

Sus frutos son consumidos por la avifauna. No es una especie pionera, pero podría utilizarse para realizar enriquecimientos en procesos de restauración ecológica.



Esta especie hace parte del listado de especies forestales no maderables del Valle del Cauca.

Esta especie hace parte del listado de especies forestales no maderables del Valle del Cauca.

Chontilla, perrero (*Aiphanes simplex*)



Especie de palma nativa, endémica de Colombia, que alcanza hasta los 4 metros de altura, con un diámetro de 2 centímetros. Es una especie de crecimiento lento y se desarrolla en el sotobosque, a orillas de caminos y quebradas.

Se puede encontrar desde los 800 hasta los 2200 metros sobre el nivel del mar. Es cespitosa o que presenta varios tallos, llegando a tener hasta 20. Presenta espinas en el tallo y en la vaina de las hojas. Prefiere suelos fértiles y bien drenados, y sus frutos son consumidos por la fauna silvestre.

Palma zancona

(Syagrus sancona)

Especie de palma nativa. Es muy común en las plazas y parques de la mayoría de las poblaciones del Valle del Cauca, por ejemplo, en la plaza de Caicedo en Cali, o la plaza de Bolívar en Palmira. Estas esbeltas palmas alcanzan hasta 30 metros de altura y 25 cm de diámetro. Es de crecimiento rápido y puede vivir más de 60 años. Requiere espacios con buena iluminación solar y suelos con buen drenaje. Una vez establecidas, las palmas son bastante resistentes a las sequías.

Crece entre los 100 y 1800 metros sobre el nivel del mar. Se desarrolla en bosques secundarios y potreros.

Ofrece alimento a la fauna nativa, pero, sobre todo, es sitio de anidación para varias especies de aves.

Presenta un grado de amenaza vulnerable (VU). Este grado de amenaza se origina por la destrucción de su hábitat.



Palma corozo de puerco (*Attalea butyracea*)



La palma de vino o corozo de puerco (*Attalea butyracea*) es una especie nativa de Colombia que crece desde el nivel del mar hasta los 1000 msnm, en regiones como el Caribe, la Orinoquía y los valles de los ríos Cauca y Magdalena. Puede alcanzar hasta 25 m de altura y vivir más de 60 años, siendo una especie de crecimiento lento pero muy resistente.

Cumple un importante papel ecológico al servir de refugio y sitio de anidamiento para aves, murciélagos e insectos. Forma rodales llamados palmitales que favorecen la biodiversidad.

Aunque la UICN la clasifica como de "preocupación menor", en el Valle del Cauca y Cauca su aprovechamiento está restringido por la CVC.



Tradicionalmente ha sido muy valorada por las comunidades rurales: sus hojas se usan para techos, abanicos y escobas; el cogollo para envolver alimentos, y el fruto como alimento para animales. También se cultiva como planta ornamental.

Su reproducción es por semillas dispersadas por mamíferos y ganado, con una germinación lenta pero abundante. En algunas zonas se ha asociado con la presencia de insectos vectores del mal de Chagas, por lo que se recomienda un manejo cuidadoso.

Símbolo del paisaje colombiano, la palma de vino combina valor ecológico, cultural y práctico, siendo fundamental promover su uso sostenible y su conservación.



Canales de Atención



 www.cvc.gov.co

 #550

Redes Sociales

 ***CVCambiental***

 ***CvcAmbiental***

 ***CVC_ambiental***

 ***cvcambiental***